貯 藏 法：本品應置於緊密阻光容器內，於冷暗處貯之。

用途分類：製劑輔助劑。

芳香氨醑

Aromatic Ammonia Spirit

本品每 100mL 所含總 NH_3 應為 1.7～2.1g，所含 $(NH_4)_2CO_3$ 應為 3.5～4.5g。

製　　法：本品製造時所用之原料及其用量如下：

碳酸銨（半透明塊）	34 g
氨試液	90 mL
檸檬油	10 mL
薰衣草油	1 mL
肉豆蔻油	1 mL
乙醇	700 mL
蒸餾水	適　量
共　製	1000 mL

取碳酸銨，置有塞玻璃瓶內，加氨試液及蒸餾水 140mL，密塞，徐徐振搖使其溶解，靜置十二小時。另將上列各油及乙醇置於 1000-mL 有塞量筒內，混和使其溶解後，將碳酸銨溶液徐徐加入，再添加適量之蒸餾水使全量達 1000mL，密塞，時加振搖，於冷處放置二十四小時，過濾（漏斗上需加蓋），即得。

性　　狀：

⑴一般性狀——本品為殆無色之澄明溶液，但貯存日久則漸變為黃色。具芳香刺激之臭，且有氨味。遇光則變質。

⑵比重——本品之比重約為 0.90（通則 1005）。

含量測定：

⑴總 NH_3 量——精確量取本品 10.0mL，置於貯有水約 50mL 之 250-mL 錐形瓶中，加 0.5N 硫酸 30mL，煮沸使溶液變為澄明。放冷，以甲基紅試液為指示劑，用 0.5N 氫氧化鈉液滴定過剩之酸。每 mL 之 0.5N 硫酸相當於 8.516mg 之 NH_3。

⑵碳酸銨——精確量取本品 10.0mL，置 300-mL 燒瓶中，加 0.5N 氫氧化鈉液約 30mL，煮沸，直至發出之蒸氣不再使濕潤之紅色石蕊試紙變藍色為止。並隨時添加適量之水，以補充因蒸發時所失去之水分，放冷，以新煮沸冷卻之水 100mL 稀釋，加酚酞試液 6 滴，再加適量之 0.5N 硫酸使溶液之石竹紅色適變為無色，然後加甲基橙試液 3 滴，用 0.5N 硫酸滴定之。以甲基橙試液為指示劑滴定時所耗之 0.5N 硫酸，每 mL 相當於 48.05mg 之 $(NH_4)_2CO_3$。

含乙醇量：取本品按照乙醇測定法（通則 3011）測定之，其所含乙醇應為 62～68%v/v。

貯 藏 法：本品應置於緊密阻光容器內，於 30° 以下貯之。

用途分類：呼吸興奮劑。

芳香酏

Aromatic Elixir

製　　法：製造本品時所用之原料及其用量如下：

複方橙皮酊	12 mL
糖漿	375 mL
滑石粉	30 g
乙醇	適　量
蒸餾水	適　量
共　製	1000 mL

取複方橙皮酊，加適量之乙醇使成 250mL，然後將糖漿分次加入，每次加入後即用力震搖之。再用同法加適量之蒸餾水使成 1000mL。最後加入滑石粉混合，用經稀乙醇潤濕之濾器反覆過濾，俟濾液澄明，即得。

含乙醇量：取本品按照乙醇測定法（通則 3011）測定之，其所含乙醇應為 21～23%v/v。

貯 藏 法：本品應置於緊密容器內貯之。

用途分類：矯味劑。

芳香醑

Aromatic Spirit

製　　法：本品製造時所用之原料及其用量如下：

丁香（搗碎者）	15 g
桂皮（切碎者）	15 g
肉豆蔻（搗碎者）	30 g
豆蔻（搗碎者）	30 g
乙醇 90%	800 mL
檸檬油	1 mL
薄荷油	2 mL
水	1200 mL
共　製	1000 mL